



ASTARTÉ

Association Transméditerranéenne
Femme et Cancer du Sein عشتار

Vers une Communauté Euro-Méditerranée pour la Santé du Sein Féminin

CANCER DU SEIN

Les signes d'alerte : quand consulter un médecin ou une sage-femme?

« Toute modification ou déformation du sein, ou l'apparition d'une boule dans le sein ou l'aisselle persistant dans le temps (au moins 2 semaines), doit vous alerter »



1. Une boule ou une masse dans un sein est le signe d'un cancer du sein le plus fréquent. En général de consistance dure , elle est non douloureuse, parfois le sein est déformé par cette boule.

2. Une boule dure au niveau de l'aisselle. Cela peut signifier qu'un cancer du sein s'est propagé aux ganglions axillaires. Les ganglions restent indolores.

3. Un changement de la taille ou de la forme du sein
Une rougeur, un gonflement (œdème) ou une chaleur importante au niveau du sein peuvent être le signe d'un cancer du sein inflammatoire, ou d'un cancer négligé.

4. Des modifications de la peau du sein ,La peau du sein peut devenir capitonnée (et prendre l'aspect d'une peau d'orange) ou plissée, cartonnée, parfois rouge.

5. Des modifications du mamelon

Le mamelon peut se déformer, ou rentrer vers l'intérieur; parfois il existe une croûte, qui ne guérit pas.

Un écoulement d'un seul mamelon peut être le signe de cancer du sein, en particulier s'il contient du sang ,

6. Les autres symptômes

Si le cancer n'est pas diagnostiqué dès l'apparition des premiers symptômes, la tumeur peut grossir et se propager vers d'autres parties du corps, entraînant ainsi d'autres symptômes comme:

Des douleurs osseuses ;

Des nausées, une perte d'appétit, une perte de poids et une jaunisse ;

Un essoufflement, une toux ;

Des maux de tête, une vision double et une faiblesse musculaire.

**SI 1 DE CES SIGNES EST APPARU RECEMMENT :
CONSULTER UN MEDECIN OU UNE SAGE FEMME**

LE CANCER DU SEIN (OMS 2012)



Dans le monde:
1,67 millions de femmes
520 000 sont décédées

C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes, dans tous les pays du monde;

Son incidence augmente dans les pays en voie de développement, en particulier en Afrique.



AU TOGO CHAQUE ANNEE :

603 femmes atteintes
314 femmes décèdent

Nous contacter :

Association ASTARTE, siège social : Centre François Baclesse

Avenue du général Harris

14076 CAEN, cedex 05- FRANCE

contact@astarte-cancer.org